

PRODUK ICA International Chemical

1. Virukill™

1) Komposisi

Didecyldimethyl Ammonium Chloride 120 g/l

2) Sifat-sifat

Desinfektan berspektrum luas yang dapat digunakan secara manual, dipping/direndam, spray ataupun pengasapan/fogging. Virukill efektif pada pH yang luas, suhu tinggi maupun rendah dan tidak bersifat korosif.

3) Indikasi

Untuk mendesinfeksi kandang, gudang, tempat pemerahan, peralatan, mesin tetas, dan tempat-tempat lain di peternakan. Juga dapat digunakan untuk mendesinfeksi telur tetas, atau dicampurkan dalam air minum.

4) Dosis dan Cara Pemakaian :

Keperluan	Agen penyakit	Dosis	Cara penggunaan
Mencuci dan membersihkan permukaan	Virus, bakteri, jamur, mycoplasma, yeast dan alga	200 ml per 100 lt air	Semprotkan 0.5 – 1 L per m ² pada permukaan dan bilas setelah 30 menit
Mendesinfeksi semua tempat hewan (kandang ayam, anjing, kuda, gudang, tempat pemerahan, laboratorium, dll) semua permukaan, peralatan, mesin tetas, dan untuk membilas saluran air		1 lt per 100 lt air	Siramkan pada permukaan (300-400 ml larutan per m ²) dan didiamkan sampai kering
Untuk merendam kaki dan kendaraan		1 lt per 25 lt air	Buang larutan jika mulai kotor
Pada air minum		100 ml per 1000 lt air	Dapat digunakan secara terus menerus
Mendesinfeksi tempat sebelum bekerja (berhubungan) dengan hewan		1 lt per 100 lt air	Digunakan secara spray atau fogging (pengasapan)
Mendesinfeksi tempat selama bekerja (berhubungan) dengan hewan		1 lt per 100 lt air, 1 – 3 kali per hari	Digunakan secara spray atau fogging (pengasapan)
Mendesinfeksi telur tetas.		1 lt per 100 lt air	Dianjurkan larutan yang disemprotkan mempunyai temperatur yang sama dengan telur tetas

5) Kemasan : 1 box @ 12 x 1 liter, 200 liter